

THIAMETOP

250 WG

INSECTICIDA AGRÍCOLA

PQUA N° 3247 - SENASA

I. Información del Producto.

Nombre Comercial	: THIAMETOP 250 WG
Clase de Uso	: Insecticida Agrícola
Ingrediente Activo	: Thiamethoxam
Concentración	: 250 g/Kg
Formulación	: Gránulos Dispersables (WG)
Grupo Químico	: Neonicotinoide.
Grupo IRAC	: 4 A
Registro	: Reg. PQUA N° 3247 - SENASA
Categoría Toxicológica	: Ligeramente Peligroso

II. Datos de la Empresa.

Importador/Distribuidor : Silvestre International Company S.A.C. (SICSAC)

Titular del Registro : Silvestre International Company S.A.C. (SICSAC)

III. Modo y Mecanismo de Acción.

THIAMETOP 250 WG es un insecticida que presenta actividad translaminar y sistémica; actúa sobre el sistema nervioso central de los insectos picadores chupadores, causándoles una sobre excitación y muerte.

Gracias a su alta sistematicidad y rápida absorción, **THIAMETOP 250 WG** puede usarse en aspersión foliar. De esta manera, el producto ingresa y se distribuye en la planta, protegiendo el cultivo.

IV. Características Físicoquímicas del Formulado.

Estado físico	: Sólido (Gránulos).
Color	: Marrón Claro.
Olor	: Característico débil.
Densidad relativa a 20 °C	: 0.825 ± 0.01 g/ml
pH	: 6 - 8

V. Características Físicoquímicas del Ingrediente Activo.

Peso Molecular	: 291.71 g/mol.
Solubilidad en Agua a 20 °C	: 4100 mg/L
Coefficiente Kow	: -0.13
Presión de Vapor a 20 °C	: 6.60×10 ⁻⁶ mPa

VI. Condiciones de Aplicación.

- Aplicar el producto a primeras horas de la mañana o por la tarde, evitando las horas de máxima radiación.
- En caso de la preparación de la mezcla, llenar el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad, en un rango de pH entre 5 – 7 para asegurar la estabilidad del ingrediente activo, luego agregar el producto revolviendo constantemente y completar con agua hasta el volumen requerido.
- Debido al marcado efecto de contacto de este insecticida, complementar los tratamientos con el uso de adherentes y/o surfactantes para asegurar el mayor depósito de producto sobre a hoja tratada.
- Evitar desarrollar las aplicaciones en horas de alta radiación y temperatura.
- Usar equipo de protección personal (EPP) durante el uso, mezcla y aplicación del producto.

VII. Compatibilidad del Producto.

- No se reconoce incompatibilidad con otros plaguicidas.
- Sin embargo se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

VIII. Fitotoxicidad.

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

IX. Frecuencia y Época de la aplicación.

- Realizar como máximo 02 aplicaciones/campaña cuando se observe los primeros síntomas de daños en los brotes tiernos de las plantas de espárrago. Como máximo aplicar 0.39 kg/ha.
- Se recomienda rotar con insecticidas de diferente grupo químico siguiendo los lineamientos de IRAC (Comité de acción contra la resistencia de Insecticidas) dentro de un manejo integrado de plagas.
- No aplicar en época de floración.

Revisión : 5
Fecha : 17/07/2025
Aprobado : Área técnica

X. Precauciones y Advertencia de Uso y Aplicación.

- Este producto es dañino por inhalación.
- Evite respirar el polvo o la aspersión.
- Use protector. Causa daño temporal a los ojos.
- No coma, no beba ni fume durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- No ingerir, ni aspirar la aplicación.
- Utilice ropa protectora y guantes durante la preparación de la mezcla y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No reutilizar ni almacenar alimentos y bebidas en el envase vacío.

XI. Cuadro de Usos Recomendado.

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	kg/200L	kg/ha		
Arándano	Piojo harinoso	<i>Pseudococcus longispinus</i>	-	1.0 - 2.0*	3	0.01
Espárrago	Mosquilla de los brotes	<i>Prodiplosis longifila</i>	0.07	-	7	0.05
Mandarina	Queresa coma	<i>Lepidosaphes bekii</i>	0.05 - 0.06	-	28	0.2
Palto	Queresa	<i>Fiorinia fioriniae</i>	0.065 - 0.07	-	21	0.05
Vid	Cochinilla harinosa	<i>Planococcus citri</i>	-	1.5 - 2.5*	21	0.7

P.C.: Periodo de carencia (días)

L.M.R.: Límite máximo de residuos (ppm: partes por millón)

(*) : Dosis bajo sistema de riego por goteo

XII.Teléfonos
de
Emergencia.

SAMU : 106
SICSAC : (01) 644-9297

XIII.Condiciones de
Manejo y de
Disposición
de Desechos y
Envases Vacíos.

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

Revisión : 5
 Fecha : 17/07/2025
 Aprobado : Área técnica