

## DESCRIPCIÓN

**BIOCALYPTUS** es un formulado concentrado en extractos vegetales de Eucaliptus polibracteae que contienen compuestos metabólicos como taninos, flavonoides y terpenos; estos generan condiciones que reducen la disponibilidad de alimento y la capacidad de distribución en el campo para algunos ácaros que puedan establecerse en el cultivo, actúa por contacto y es efectivo en todas las etapas de desarrollo del individuo, incluido los huevos.

**BIOCALYPTUS** produce un alto grado disuasivo y repelente a las pocas horas de la aplicación, disminuye considerablemente las poblaciones de ácaros. Por las características mismas del producto no genera resistencia por lo que puede ser utilizado en un plan de manejo integrado.

| COMPOSICIÓN                         | (%p/v) |
|-------------------------------------|--------|
| Extracto de Eucaliptus polibracteae | 30%    |
| Ácidos orgánicos                    | 70%    |
| Concentración total                 | 100%   |

Concentración : 100%  
Formulación : Concentrado Soluble (SL)

## CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

Aspecto : Líquido  
Color : Verde  
Olor : Mentolado  
Densidad relativa : 0.94 – 1.05 g/ml  
pH : 6.0 – 7.0

## COMPATIBILIDAD

**BIOCALYPTUS** se puede emplear en mezcla con los plaguicidas agrícolas más comunes. Es recomendable efectuar una prueba de compatibilidad previa.



# biocalyptus

## COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Extracto de Eucaliptus polibracteae 30%  
+ Ácidos orgánicos 70%

CONTENIDO NETO: **1Lt**

Nº DE LOTE :  
FECHA DE FABRICACIÓN :  
FECHA DE VENCIMIENTO :

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR :



## RECOMENDACIONES DE USO

- Mantener lejos del alcance de los niños.
- Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.
- Evitar el contacto con las partes húmedas del cuerpo, especialmente los ojos.
- En caso de accidente o malestar acuda inmediatamente al médico (si es posible muéstrele la etiqueta).
- En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con agua.
- No almacenar en otro envase distinto al original.

## CUADRO DE USOS

| CULTIVO                                                | DOSIS     |       | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------|-----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        | L/200L    | L/Ha  |                                                                                                                                                                                                                                              |
| Alcachofa, ajo, espárrago, cebolla.                    | 0.6 - 1.0 | 2 - 3 | Aplicar en la etapa del desarrollo vegetativo o cuando se establezca los grados iniciales como 1 y 2 de la plaga (ninfas de trips), en caso de observar posturas, repetir las aplicaciones cada 5 días.                                      |
| Limón, mandarina, tangelo, palto, maracuyá, granadilla | 0.4 - 0.6 | 4 - 6 | Aplicar la dosis de 0.5 L/cil en caso de tener presencia de araña, en caso de presencia de picadores-chupadores 0.5 - 0.75 L/cil., repetir las aplicaciones cada 5 a 7 días en caso de alta infestación.                                     |
| Fresa, arándanos, frambuesa y aguaymanto.              | 0.6 - 1.0 | 3 - 5 | Aplicar la dosis de 0.5 L/cil en caso de tener presencia de araña, en caso de presencia de picadores-chupadores 0.5 - 0.75 L/cil., repetir las aplicaciones cada 5 a 7 días en caso de alta infestación.                                     |
| Sandía, zapallo, melón, pepinillo, pepino              | 0.6 - 1.0 | 2 - 3 | Aplicar en las etapas de hoja madura y desarrollo de fruto para la protección contra arañas, mosca blanca y trips de 0.5 - 0.75 L/cil, repetir la aplicación de 5 a 7 días.                                                                  |
| Melocotón, manzano, kiwi, membrillo                    | 0.6 - 1.0 | 4 - 6 | Aplicar la dosis de 0.5 L/cil en caso de tener presencia de araña, en caso de presencia de picadores-chupadores y trips de 0.5 - 0.75 L/cil., repetir las aplicaciones cada 5 a 7 días en caso de alta infestación.                          |
| Uvas de mesa y viníferas                               | 0.4 - 0.8 | 4 - 6 | Aplicar la dosis de 0.5 L/cil en caso de tener presencia de arañas en etapas cercanas a la cosecha, en caso de presencia de chanchito y trips subir la dosis a 0.75 - 1.0 L/cil., se recomienda realizar pruebas de compatibilidad en bayas. |

## FABRICADO Y EXPORTADO POR

AGROALKIMIA S.L.  
Adra, Almería, España  
Producto fabricado en la Unión Europea  
<https://agroalkimia.com/>  
[info@agroalkimia.com](mailto:info@agroalkimia.com)



## IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR

SILVESTRE INTERNATIONAL COMPANY S.A.C  
RUC 20603903359  
<https://www.silvestreinternationalcompany.com/>  
Edificio Park Office, Av. Javier Prado Este Nº 6210, Piso 3  
Oficina Nº 306 - La Molina, Lima - Perú.