

DESCRIPCIÓN

BIOCITRALL es un formulado obtenido por la extracción de aceites de poáceas, estos contienen terpenos, alcaloides y compuestos fenólicos que logran inducir un efecto escudo al generar una capa protectora sobre las hojas tratadas, reduciendo la disponibilidad de alimento para algunos ácaros que puedan establecerse en el cultivo.

BIOCITRALL también contiene silicio, por lo tanto, refuerza la pared celular, fortaleciendo la estructura física del cultivo y protegiéndolo del ataque de agentes externos. Además, tiene sinergias con el calcio, el magnesio y el potasio, mejorando su absorción y transporte en la planta.

COMPOSICIÓN

RIQUEZA	(%P/V)
Aceite de <i>Poáceas</i>	50%
Silicio	5%
Concentración Total	55%



FITOPROTECTANTE - BIOACARICIDA

BiOCITRALL



Formulado por:
2MBIO Co., Ltd. - Korea



N° Lote :
F. de Form. :
F. de Venc. :

Importado y Distribuido por:
SILVESTRE INTERNATIONAL
COMPANY S.A.C.



Contenido Neto: **1 L**

RECOMENDACIONES DE USO

- Mantener lejos del alcance de los niños.
- Manténgase lejos de alimentos, bebidas y pienso.
- Evitar el contacto con las partes húmedas del cuerpo, especialmente los ojos.
- En caso de accidente o malestar acuda inmediatamente al médico (si es posible muéstrela la etiqueta).
- En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con agua.
- No almacenar en otro envase distinto al original.

CUADRO DE USOS

CULTIVO	DOSIS		OBSERVACIONES
	L/200L	L/Ha	
Alcachofa, ajo, espárrago, cebolla.	0.4 - 0.6	1 - 2	Aplicar en la etapa del desarrollo vegetativo o cuando se establezca los grados 1 y 2 de la plaga, en caso de observar posturas, repetir las aplicaciones cada 5 días.
Limón, mandarina, tangelo, palto, maracuyá, granadilla.	0.4 - 0.6	2 - 5	Aplicar en la etapa del desarrollo vegetativo o crecimiento de fruta, cuando se establezca los grados 1 y 2 de la plaga, en caso de observar posturas, repetir las aplicaciones cada 5 a 7 días.
Fresa, arándanos, frambuesa y aguaymanto.	0.4 - 0.6	1 - 2	Aplicar en las etapas de hoja madura y desarrollo de fruto, en rotación y/o mezclas con productos de control químico con una frecuencia de 5 a 7 días en campos con alta infestación de posturas.
Sandía, zapallo, melón, pepinillo, pepino.	0.4 - 0.6	1 - 2	Aplicar en las etapas de hoja madura y desarrollo de fruto, en rotación y/o mezclas con productos de control químico con una frecuencia de 5 a 7 días en campos con alta infestación de posturas.
Melocotón, manzano, kiwi, membrillo.	0.4 - 0.6	2 - 5	Aplicar en la etapa del desarrollo vegetativo o cuando se establezca los grados 1 y 2 de la plaga, en caso de observar posturas, repetir las aplicaciones cada 5 días.
Uvas de mesa y viníferas	0.4 - 0.6	2 - 5	Aplicar en las etapas de desarrollo vegetativo, envero y maduración, o cuando se establezca los grados 1 y 2 de la plaga.