

DESCRIPCIÓN

BIOMURIKATA es un producto orgánico de última generación, rico en aceites vegetales de anonáceas, el cuál genera un efecto escudo, al desarrollar una capa protectora sobre las hojas tratadas que dificulta el proceso de alimentación y el movimiento para algunas plagas (arañitas) que se establecen en el cultivo.

BIOMURIKATA presenta una serie de metabolitos secundarios como saponinas, terpenoides y compuestos fenólicos, los cuales reducen drásticamente las condiciones para el desarrollo de las plagas.

BIOMURIKATA puede ser usado en tratamientos fitosanitarios como potenciador de acaricidas químicos los cuales presentan baja eficacia debido a su uso excesivo.

BIOMURIKATA puede ser usado para un control secundario de insectos de cuerpo blando en sus estados juveniles.

COMPOSICIÓN

RIQUEZA	(%P/V)
Aceite de <i>Annona muricata</i>	70%
Manganeso	4%
Concentración Total	74%



FITOPROTECTANTE - BIOACARICIDA

BIOMURIKATA



Formulado por:
2MBIO Co., Ltd. - Korea



N° Lote :
F. de Form. :
F. de Venc. :

Importado y Distribuido por:
SILVESTRE INTERNATIONAL
COMPANY S.A.C.



Contenido Neto: **1 L**

RECOMENDACIONES DE USO

- Mantener lejos del alcance de los niños.
- Manténgase lejos de alimentos, bebidas y pienso.
- Evitar el contacto con las partes húmedas del cuerpo, especialmente los ojos.
- En caso de accidente o malestar acuda inmediatamente al médico (si es posible muéstrela la etiqueta).
- En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con agua.
- No almacenar en otro envase distinto al original.

CUADRO DE USOS

CULTIVO	DOSIS		OBSERVACIONES
	L/200L	L/Ha	
Alcachofa, ajo, espárrago, cebolla.	0.3 - 0.5	1 - 1.5	Aplicar en la etapa del desarrollo vegetativo o cuando se establezca los grados 1 y 2 de la plaga, en caso de observar posturas, repetir las aplicaciones cada 5 días.
Limón, mandarina, tangelo, palto, maracuyá, granadilla.	0.3 - 0.5	3 - 6	Aplicar en la etapa del desarrollo vegetativo o crecimiento de fruta, cuando se establezca los grados 1 y 2 de la plaga, en caso de observar posturas, repetir las aplicaciones cada 5 a 7 días.
Fresa, arándanos, frambuesa y aguaymanto.	0.3 - 0.5	1 - 1.5	Aplicar en las etapas de hoja madura y desarrollo de fruto, en rotación y/o mezclas con productos de control químico con una frecuencia de 5 a 7 días en campos con alta infestación de posturas.
Sandía, zapallo, melón, pepinillo, pepino.	0.3 - 0.5	1 - 1.5	Aplicar en las etapas de hoja madura y desarrollo de fruto, en rotación y/o mezclas con productos de control químico con una frecuencia de 5 a 7 días en campos con alta infestación de posturas.
Melocotón, manzano, kiwi, membrillo.	0.3 - 0.5	3 - 6	Aplicar en la etapa del desarrollo vegetativo o cuando se establezca los grados 1 y 2 de la plaga, en caso de observar posturas, repetir las aplicaciones cada 5 días.
Uvas de mesa y viníferas	0.3 - 0.5	3 - 6	Aplicar en las etapas de desarrollo vegetativo, envero y maduración, o cuando se establezca los grados 1 y 2 de la plaga.