

DESCRIPCIÓN

BIOURTIKAL es un bioprotector natural a base de extracto de Urtica spp. (Ortiga dioica), el cuál genera un efecto escudo, al desarrollar una capa protectora sobre las hojas tratadas que dificulta el proceso de alimentación y el movimiento para algunas plagas (arañitas) que se establecen en el cultivo.

BIOURTIKAL contiene metabolitos como diterpenos, compuestos fenólicos y flavonoides; que ejerce un efecto repelente y perturbador sobre las plagas afectando la capacidad de alimentación y reproducción de los insectos tratados.

BIOURTIKAL contiene en su extracto nitrógeno, hierro y manganeso y calcio en forma de complejos orgánico minerales, favoreciendo la síntesis de clorofila y aumentando de la tasa fotosintética, esto se traduce en cultivos más sanos, equilibrados y productivos.

COMPOSICIÓN	(%p/v)
Extracto de de ertiga dioica	15%
Concentración total	15%

Concentración : 15%
Formulación : Concentrado Soluble (SL)

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

Aspecto : Líquido
Color : Marrón
Olor : Vegetal
Densidad relativa : 0.94 – 1.05 g/ml
pH : 6.5 – 7.5

COMPATIBILIDAD

BIOURTIKAL se puede emplear en mezcla con los plaguicidas agrícolas más comunes. Es recomendable efectuar una prueba de compatibilidad previa.



biourtikal

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Extracto de Ortiga Dioica 15%

CONTENIDO NETO: **1Lt**

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR : **SICSAC**
SILVESTRE INTERNATIONAL COMPANY

RECOMENDACIONES DE USO

- Mantener lejos del alcance de los niños.
- Manténgase lejos de alimentos, bebidas y pienso.
- Evitar el contacto con las partes húmedas del cuerpo, especialmente los ojos.
- En caso de accidente o malestar acuda inmediatamente al médico (si es posible muéstrele la etiqueta).
- En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con agua.
- No almacenar en otro envase distinto al original.

CUADRO DE USOS

CULTIVO	DOSIS		OBSERVACIONES
	L/200L	L/Ha	
Alcachofa, ajo, espárrago, cebolla.	0.5 - 1.0	2 - 3	Aplicar en la etapa del desarrollo vegetativo o cuando se establezca los grados iniciales como 1 y 2 de la plaga (ninfas de thrips) , en caso de observar posturas, repetir las aplicaciones cada 5 días.
Límon, mandarina, tangelo, palto, maracuyá, granadilla	0.5 - 1.0	4 - 6	Aplicar la dosis de 0.5 L/cil en caso de tener presencia de arañita, en caso de presencia de picadores-chupadores 0.5 - 0.75 L/cil., repetir las aplicaciones cada 5 a 7 días en caso de alta infestación.
Fresa, arándanos, frambuesa y aguaymanto.	0.5 - 1.0	3 - 5	Aplicar en las etapas de prefloración y desarrollo de frutos, en caso de tener presencia de thrips y chanchitos ocupar la dosis de 0.75 - 1.0 L/cil. repetir cada 5 días rotando con otros extractos y/o insecticidas.
Sandía, zapallo, melón, pepinillo, pepino	0.5 - 1.0	2 - 3	Aplicar en las etapas de hoja madura y desarrollo de fruto para la protección contra arañitas y mosca blanca, repetir la aplicación de 5 a 7 días.
Melocotón, manzano, kiwi, membrillo	0.5 - 1.0	4 - 6	Aplicar la dosis de 0.5 L/cil en caso de tener presencia de arañita, en caso de presencia de picadores-chupadores 0.5 - 0.75 L/cil., repetir las aplicaciones cada 5 a 7 días en caso de alta infestación.
Uvas de mesa y viníferas	0.5 - 1.0	4 - 6	Aplicar la dosis de 0.5 L/cil en caso de tener presencia de arañitas en etapas cercanas a la cosecha, en caso de presencia de picadores-chupadores y thrips subir la dosis a 0.75 - 1.0 L/cil., se recomienda realizar pruebas de compatibilidad en bayas.

FABRICADO Y EXPORTADO POR

AGROALKIMIA S.L.
Adra, Almería, España
Producto fabricado en la Unión Europea
<https://agroalkimia.com/>
info@agroalkimia.com



IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR

SILVESTRE INTERNATIONAL COMPANY S.A.C
RUC 20603903359
<https://www.silvestreinternationalcompany.com/>
Edificio Park Office, Av. Javier Prado Este N° 6210, Piso 3
Oficina N° 306 - La Molina, Lima - Perú.