

CARACTERÍSTICAS

FITOSOL es un inductor fisiológico de alta eficiencia formulado a base de fosfito de potasio, que combina nutrición y bioestimulación en un solo producto. Su aporte de potasio de rápida asimilación optimiza la fotosíntesis, la regulación hídrica y el llenado de frutos, mientras que el fósforo en forma de ión fosfito activa la Resistencia Sistémica Adquirida (SAR), estimulando la síntesis de fitoalexinas y fortaleciendo las defensas naturales de la planta frente a enfermedades. Los cultivos tratados con **FITOSOL** muestran una mayor capacidad para superar condiciones de estrés biótico y abiótico, gracias a la acción combinada del fósforo y el potasio. Favorece la floración, el amarre de frutos y el desarrollo vegetativo, incrementando el índice de área foliar y la eficiencia fotosintética. Asimismo, corrige deficiencias nutricionales de estos elementos, promoviendo mayor vigor, lignificación y resistencia estructural frente a enfermedades y factores adversos.

Además de fortalecer el sistema inmunológico de las plantas, **FITOSOL** contribuye a mejorar la calidad de la producción, incrementando el calibre, los sólidos solubles, la concentración de antocianinas y la firmeza de los frutos, prolongando su vida poscosecha.

COMPOSICIÓN

COMPOSICIÓN	RIQUEZA (% p/v)
FÓSFORO (P ₂ O ₅)	42.60
POTASIO (K ₂ O)	28.40
Total Fosfito de Potasio	71.00

Concentración : 71%
Formulación : Concentrado Soluble (SL)

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto : Líquido
Color : Transparente
Olor : Característico
Densidad relativa : 1.27 - 1.42 g/cc
pH : 4.7 - 5.6

Producto acorde a la comunidad Europea (EG) N°1272/2008, anexo VII. Regulación 67/548/EWG ó regulación 1999/45/EG la sustancia no está clasificada como peligrosa para la salud ni el medio ambiente. Puede causar irritación a personas sensibles en ojos, piel o vías respiratorias. En caso de contacto con los ojos, limpiar bien durante varios minutos con agua corriente. Si los síntomas persisten, consultar al médico. En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón, y enjuagarse bien, si los síntomas persisten consultar al médico.



CONTENIDO NETO: 1Lt

N° DE LOTE :
FECHA DE FABRICACIÓN :
FECHA DE VENCIMIENTO :

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR :



DOSIS Y APLICACIÓN

CULTIVO	DOSIS		RECOMENDACIÓN
	L/Cil	L/ha	
Ají, tomate, pimiento	0.5 - 1	2.0 - 3.0	Aplicar después del trasplante y realizar 2- 3 aplicaciones con frecuencia de 10 a 15 días. Complementar aplicaciones en etapa de cuajado y desarrollo de fruto, dependiendo la presión de la enfermedad.
Ajo, alcachofa, espárrago, cebolla	0.5 - 1	2.0 - 3.0	Aplicar una semana después del trasplante y luego cada 15 días, dependiendo la presión de la enfermedad.
Arándano, frambuesa,berries	0.5 - 1	3.0 - 4.0	Aplicar al inicio del brotamiento, prefloración y floración hasta completar tres aplicaciones.
Arroz, maíz y cereales.	0.5 - 1	2.0 - 3.0	Aplicar en desarrollo desde la 3era a 8ta hoja y en las etapas de máxima susceptibilidad del cultivo.
Brócoli, coliflor, col, lechuga	0.5 - 1	2.0 - 3.0	Aplicar en etapa de crecimiento de vegetativo hasta etapa de formación de cabeza.
Frijol, holantao, arveja y otras leguminosas	0.5 - 1	2.0 - 3.0	Aplicar en etapa de crecimiento vegetativo hasta floración en función de la presión de la enfermedad.
Manzano, melocotón, durazno, granado	0.5 - 1	3.0 - 4.0	Aplicar al inicio del brotamiento, prefloración y floración hasta completar tres aplicaciones.
Palto, mango, cítricos, maracuyá, etc.	0.5 - 1	3.0 - 4.0	Aplicar al inicio de brotamiento, en desarrollo de yema y prefloración, considerar una dosis de 15 a 25 ml por arbol en función al tamaño de la copa.
Pepino, sandía, melón, fresas.	0.5 - 1	2.0 - 3.0	Aplicar una semana después del trasplante y luego cada 15 días, dependiendo la presión de la enfermedad.
Papa, camote, yuca y otras raíces y tuberosas	0.5 - 1	2.0 - 3.0	Aplicar en etapa de crecimiento de vegetativo hasta etapa de tuberización.
Uva de mesa y viníferas	0.5 - 1	3.0 - 4.0	Aplicar al inicio del brotamiento, prefloración y floración hasta completar tres aplicaciones.

COMPATIBILIDAD

FITOSOL se puede mezclar con la mayoría de productos fitosanitarios, sin embargo, recomendamos realizar pruebas previas a la aplicación a nivel de campo. No mezclar con productos a base de calcio, cobre, azufres, caldo bordelés, aceites, dicofol, dimetoato, dinocap, productos de alta reacción ácida o alcalina, productos peroxiacéticos ni hipocloritos.

FABRICADO Y EXPORTADO POR

AGROALKIMIA S.L.
Adra, Almería, España
Producto fabricado en la Unión Europea
<https://agroalkimia.com/>
info@agroalkimia.com



IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR

Silvestre International Company S.A.C.
RUC 20603903359
<https://www.silvestreinternationalcompany.com/>
Edificio Park Office, Av. Javier Prado Este N° 6210, Piso 3,
Oficina N° 306 - La Molina, Lima - Perú.