

CARACTERÍSTICAS

FLORASTIN XL es un bioestimulante de avanzada formulación que gracias a sus componentes folcisteína y ácido glutámico activa la síntesis de antioxidantes y de sustancias osmoreguladoras como el glutatión y prolina. Su acción regula la tasa de transpiración de las plantas tratadas, protegiendo el balance hídrico celular durante los procesos de división y desarrollo, asegurando así un crecimiento más uniforme y resistente.

FLORASTIN XL previene y recupera el estrés abiótico ocasionado por temperaturas extremas, déficits hídricos continuos o transitorios, exceso de sales y golpes térmicos. La folcisteína mejorada (AATC+ATC), estimula el desarrollo de yemas en prefloración, regula y concentra la floración, mejora el cuajado de frutos e incrementa la masa radicular, generando un equilibrio integral en el desarrollo de los cultivos.

FLORASTIN XL incorpora en su formulación una concentración adecuada de *brasiñoesteroides*, fitohormonas esenciales para complementar la acción de folcisteína y potenciar los procesos de la elongación y división celular, mejorar la síntesis de clorofila, aumento de la capacidad fotosintética y refuerzo de los mecanismos de tolerancia de estrés abiótico. De esta manera, contribuyen a un mayor vigor vegetativo, mejor aprovechamiento de nutrientes y un incremento en la productividad y calidad final de la cosecha.

COMPOSICIÓN

COMPOSICIÓN	RIQUEZA (%)
AATC (ácido N-Acetyl-thiazolidin-4-carboxílico)	3.0 %
ATC (ácido thiazolidin-4-carboxílico)	3.0 %
FOLCISTEÍNA TOTAL	6.0 %
AMINOÁCIDOS (ácido glutámico)	6.0 %
ÁCIDO FÓLICO	0.1 %
Extractos vegetales ricos en <i>brasiñoesteroides</i>	10.0 %

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto : Líquido.
Color : Marrón claro.
Olor : Fermentado.
Densidad relativa : 1.18 g/mL
pH : 4.5

Producto acorde a la comunidad Europea (EG) N° 1272/2008, anexo VII. Regulación 67/548/EWG ó regulación1999/45/EG la sustancia no está clasificada como peligrosa para la salud ni medio ambiente. Puede causar irritación a personas sensibles en ojos, piel o vías respiratorias. En caso contacto con los ojos, limpiar bien durante varios minutos con agua corriente. Si los síntomas persisten, consultar al médico. En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón, y enjuagarse bien. Si los síntomas persisten consultar al médico.



1 Lt

N° de Lote :
Fecha de Fabricación :
Fecha de Vencimiento :

Importado y Distribuido por :



DOSIS Y APLICACIÓN

CULTIVO	DOSIS			RECOMENDACIÓN
	MOCHILA	CILINDRO	Ha	
Algodón, flores y ornamentales.	20 - 30 mL	200 - 300 mL	300 - 500 mL	2 aplicaciones: 1.- Al inicio de la floración. 2.- En plena floración.
Cereales: arroz, avena, maíz, quinua, trigo, sorgo.	20 - 30 mL	200 - 300 mL	300 - 500 mL	2 aplicaciones: 1.- Al inicio de la floración. 2.- En plena floración.
Hortalizas: Ajo, alcachofa, apio, berenjena, betarraga, brocoli, cebolla, col, coliflor, espinaca, lechuga, nabo, pepino, poro, rábano, rucola, tomate, zapallo. Aji, paprika, pimiento, piquillo y demás ajíes.	30 - 50 mL	300 - 500 mL	500 - 800 mL	De 3 a 5 aplicaciones: 1.- Aplicar una semana después del trasplante. 2.- En formación de botones. 3.- Prefloración. 4 y 5.- Aplicación durante el llenado de frutos hasta la cosecha.
Leguminosas: Arveja, frijol, garbanzo, habas, holantao, pallar, vainita.	20 - 30 mL	200 - 300 mL	300 - 500 mL	De 3 a 5 aplicaciones cada 20 días a partir de que la planta tenga 4 a 6 hojas.
Tubérculos y raíces: Camote, oca, olluco, papa, yuca y otros.	20 - 30 mL	200 - 300 mL	300 - 500 mL	3 aplicaciones: 1.- Cuando las plantas tengan 5-6 hojas. 2.- Al inicio de la floración. 3.- En plena tuberización.
Frutales siempre verdes: Cacao, café, chirimoya, dátil, fresa, granadilla, guanábana, limón, lúcuma, mandarina, mango, maracuyá, naranja, olivo, palto, papayo, pepino dulce, platano, tangelo, tuna y demás frutales	15 - 20 mL	150 - 200 mL	1,000 - 2,000 mL	De 3 a 5 aplicaciones. 1.- Aplicar durante el desarrollo del cultivo. 2.- Aplicar durante formación y desarrollo de yemas reproductivas. 3.- Aplicar en floración plena. 4 y 5.- Aplicación durante el cuajado y desarrollo de los frutos.
Frutales caducifolios: Arándano, cereza, ciruelo, granado, higo, manzano, melocotón, pecano, peral, vid y demás frutales.	15 - 20 mL	150 - 200 mL	800 - 1,000 mL	De 3 a 5 aplicaciones. 1.- Aplicar durante el brotamiento. 2.- Aplicar durante formación y desarrollo de yemas reproductivas. 3.- Aplicar en floración plena. 4 y 5.- Aplicación durante el cuajado y desarrollo de los frutos.
Desinfección de Semillas: Leguminosas, cereales, tubérculos y hortalizas.	50 - 100 mL	—	—	Tipos de aplicación: 1.- Aplicar en desinfección de semilla. 2.- Aplicar en desinfección de tubérculos. 3.- Aplicar en plantines de hortalizas 3 días antes del trasplante.

COMPATIBILIDAD

FLORASTIN XL es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con aguas carbonatadas, productos alcalinos, productos a base de cobre y ácidos fuertes. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FABRICADO Y EXPORTADO POR

AGROALKIMIA S.L
Adra, Almería, España
Producto fabricado en la Unión Europea
<https://agroalkimia.com/> // Info: info@agroalkimia.com



IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR

Silvestre International Company S.A.C.
RUC 20603903359
<https://www.silvestreinternationalcompany.com/>
Edificio Park Office, Av. Javier Prado Este N° 6210, Piso 3,
Oficina N° 306 - La Molina, Lima - Perú.