

CARACTERÍSTICAS

K-LIBRADOR MAX es un bioestimulante de última generación, basado en un proceso de bio purificación de un concentrado de Algas frescas (Ascophyllum Nodosum), este formulado concentra un alto contenido Bio citoquininas (6-Bencil amino purina), las cuales tienen un efecto marcado en la división celular de estructuras vegetativas en proceso de formación y diferenciación floral.

K-LIBRADOR MAX tiene precursores de Epi-Brasinóolidos que son sustancias que tiene como efecto el alargamiento y diferenciación celular de protoplastos, además de favorecer la regeneración de las paredes celulares de tejidos dañados por condiciones abióticas.

K-LIBRADOR MAX tiene propiedades anti estresantes y osmo reguladoras, por efecto de los bio componentes y azúcares de rápida similación, los cuales ingresan rápidamente a las vacuolas (órgano de regulación osmótica en la célula) y generan un equilibrio hídrico en los órganos de transpiración como las hojas, permitiendo así superar condiciones de estrés hídrico, golpes térmicos, estrés salino y cualquier desequilibrio generado por condiciones abióticas.

K-LIBRADOR MAX presenta un encapsulamiento de todos los bio componentes del formulado, permitiendo así una rápida asimilación en los cultivos tratados, superando rápidamente las condiciones de estrés y recuperando sus procesos metabólicos básicos como: transpiración, absorción, fotosíntesis y translocación de azúcares.

COMPOSICIÓN

COMPOSICIÓN	RIQUEZA (%p/v)
Extractos de algas ricos en Biocitoquinina	20.00%
- Biocitoquininas (6 Bencil amino purine)	8,000 ppm
- Ácido Algínico	5.00%
Extractos vegetales ricos en Brasinosteroides	5.00%
- Precursores de Epi-Brasinóolidos	0.01 ppm
Ácidos Carboxílicos y Acomepajantes Orgánicos	5.00%
Glicina Betaina	6.00%
Pentóxido de fósforo (P ₂ O ₅)	2.00%
Óxido de potásio (K ₂ O)	3.00%

Concentración : 41%
Formulación : Concentrado Soluble (SL)

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto : Líquido.
Color : Verde.
Olor : Característico.
Densidad relativa : 1.15 g/mL
pH : 3.41

Producto acorde a la comunidad Europea (EG) N° 1272/2008, anexo VII. Regulación 67/548/EWG ó regulación1999/45/EG la sustancia no está clasificada como peligrosa para la salud ni medio ambiente.
Puede causar irritación a personas sensibles en ojos, piel o vías respiratorias. En caso contacto con los ojos, limpiar bien durante varios minutos con agua corriente. Si los síntomas persisten, consultar al médico. En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón, y enjuagarse bien. Si los síntomas persisten consultar al médico.



BIOESTIMULANTE AGRÍCOLA



POTENCIADOR DE LA DIVISIÓN CELULAR



1 Lt

N° de Lote :
Fecha de Fabricación :
Fecha de Vencimiento :

Importado y Distribuido por :



DOSIS Y APLICACIÓN

CULTIVO	DOSIS			RECOMENDACIÓN
	MÓCHILA	CILINDRO	litro	
Ajo, Cebolla, Espárrago y Alcachofa	30 - 50 mL	300 - 500 mL	0.75 - 1.5 L	2 aplicaciones: 1- Desarrollo vegetativo. 2- Inicio de bulbos o formación de primordios (alcachofa)
Cereales: arroz, avena, maíz, quinoa, trigo, sorgo.	30 - 50 mL	300 - 500 mL	0.75 - 1.5 L	3 aplicaciones: 1- Inicio de macollamiento. 2- Punto de algodón (Arroz), V3 - V4 (Maíz) 3- En plena floración.
Hortalizas: Apio, berenjena, batarraga, brócoli, cebolla, col, coliflor, espinaca, lechuga, nabo, papino, poro, rabano, rucola, tomate, zapallo. Aji, páprika, pimiento, piquillo y demás ajíes.	30 - 50 mL	300 - 500 mL	1.0 - 2.0 L	De 3 a 5 aplicaciones: 1- Aplicar 15 días después del trasplante. 2- Formación de botones. 3- Prefloración. 4- Cusado de fruto. 5- Inicio de desarrollo del fruto.
Leguminosas: Arveja, frijol, garbanzo, habas, hollando, pallar, vainita.	30 - 50 mL	300 - 500 mL	0.5 - 1.0 L	De 2 a 3 aplicaciones cada 20 días a partir de que la planta tenga 4 a 6 hojas. En prefloración e inicio de cusado.
Tubérculos y raíces: Camote, oca, olluco, papa, yuca y otros.	30 - 50 mL	300 - 500 mL	0.75 - 1.5 L	3 aplicaciones: 1- Aplicar 20 días después del brotamiento. 2- Al 1er aporque. 3- Al inicio de la tuberización.
Frutales siempre verdes: Cacao, café, chininoya, dátil, fresa, granadilla, guaraná, limón, lúcuma, mandarina, mango, maracuyá, naranjo, olivo, palto, papayo, pepino dulce, pitáano, tangelo, tuna y demás frutales.	30 - 50 mL	300 - 500 mL	2.0 - 4.0 L	De 3 a 4 aplicaciones. 1- Aplicar durante el inicio del brotamiento. 2- Aplicar durante formación y desarrollo de yemas reproductivas. 3- Aplicación durante el cusado 4- Aplicar en el desarrollo del fruto.
Frutales caducifolios: Arándano, Cereza, ciruelo, granado, higo, manzano, melocotón, pecano, peral, vid y demás frutales.	30 - 50 mL	300 - 500 mL	2.0 - 3.0 L	De 3 a 5 aplicaciones. 1- Aplicar durante el brotamiento. 2- Aplicar durante formación y desarrollo de yemas reproductivas. 3- Aplicación durante el cusado y desarrollo de los frutos.

COMPATIBILIDAD

K-LIBRADOR MAX es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con aguas carbonatadas, productos alcalinos, productos a base de cobre y ácidos fuertes. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FABRICADO Y EXPORTADO POR

BC FERTILIS S.L.
P.I. El Brosquil Albert Einstein, 11. Oliva (Valencia)
Producto fabricado en la Unión Europea
<https://bcfertilis.com/> // Info: bcfertilis@bcfertilis.com



IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR

Silvestre International Company S.A.C.
RUC 20603903359
<https://www.silvestreinternationalcompany.com/>
Edificio Park Office, Av. Javier Prado Este N° 6210, Piso 3,
Oficina N° 306 - La Molina, Lima - Perú.