



FUNGICIDA AGRÍCOLA

PQUA N° 2645 - SENASA

I. Información del Producto.

Nombre Comercial	: BELICO
Clase de Uso	: Fungicida Agrícola
Ingrediente Activo	: Difenconazole 250 g/L + Propiconazole 250 g/L
Concentración	: 500 g/L
Formulación	: Concentrado Emulsionable (EC)
Grupo Químico	: Difenconazole: Triazole Propiconazole: Triazole
Grupo FRAC	: Difenconazole : 3 Propiconazole: 3
Registro	: PQUA N° 2645 - SENASA
Categoría Toxicológica	: Ligeramente Peligroso

II. Datos de la Empresa.

Importador/Distribuidor : Silvestre International
Company S.A.C. (SICSAC)

Titular del Registro : Silvestre International
Company S.A.C. (SICSAC)

III. Modo y Mecanismo de Acción.

BELICO es un fungicida sistémico de alta eficacia gracias a sus dos ingredientes activos, difenconazole y propiconazole, que distribuyen su actividad en toda la planta.

Los ingredientes activos de **BELICO** detienen el desarrollo al interferir en la biosíntesis de esteroides en la membrana celular. Los mejores resultados del producto se obtienen cuando se aplica en los primeros estadios de desarrollo del hongo.

IV. Características Físicoquímicas del Formulado.

Estado físico	: Líquido.
Color	: Amarillo Oscuro.
Olor	: Característico.
Densidad relativa a 20 °C	: 0.9 - 1.10 g/ml
pH	: 5.0 - 8.0

V. Características Físicoquímicas del Ingrediente Activo.**DIFENOCONAZOLE:**

Peso Molecular	: 406.26 g/mol.
Solubilidad en Agua a 20 °C	: 15.0 mg/L
Coefficiente Kow	: 4.36
Presión de Vapor a 20 °C	: 3.33×10^{-5} mPa

PROPICONAZOLE:

Peso Molecular	: 342.22 g/mol.
Solubilidad en Agua a 20 °C	: 150 mg/L
Coefficiente Kow	: 3.72
Presión de Vapor a 20 °C	: 0.056 mPa

VI. Condiciones de Aplicación.

- Aplicar el producto a primeras horas de la mañana o por la tarde, evitando las horas de máxima radiación.
- En caso de la preparación de la mezcla, llenar el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad, en un rango de pH entre 5 – 7 para asegurar la estabilidad del ingrediente activo, luego agregar el producto revolviendo constantemente y completar con agua hasta el volumen requerido.
- Debido al marcado efecto de contacto de este fungicida, complementar los tratamientos con el uso de adherentes y/o surfactantes para asegurar el mayor depósito de producto sobre a hoja tratada.
- Evitar desarrollar las aplicaciones en horas de alta radiación y temperatura.
- Usar equipo de protección personal (EPP) durante el uso, mezcla y aplicación del producto.

VII. Compatibilidad del Producto.

Es compatible con la mayoría de insecticidas y fungicidas, sin embargo se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

VIII. Fitotoxicidad.

La aplicación de dosis superiores a la señalada en el cuadro de usos podría ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

IX. Frecuencia y Época de la aplicación.

Se recomienda realizar como máximo una aplicación por campaña, considerando dos campañas por año.

Se recomienda rotar con fungicidas de diferente grupo químico siguiendo los lineamientos de FRAC (Comité de acción contra la resistencia de Fungicidas) dentro de un manejo integrado de plagas.

Revisión : 4
Fecha : 07/01/2026
Aprobado : Área técnica

X. Precauciones y Advertencia de Uso y Aplicación.

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

XI. Cuadro de Usos Recomendado.

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/ha		
Arroz	Pyricularia	<i>Pyricularia oryzae</i>	0.25 - 0.3	35	(a) 3.0 (b) 7.0

P.C.: Periodo de carencia (días)

L.M.R.: Límite máximo de residuos (ppm: partes por millón)

(a) Difenconazole
(b) Propiconazole**XII.****Teléfonos
de
Emergencia.****SAMU** : 106
SICSAC : (01) 644-9297**XIII.****Condiciones de
Manejo y de
Disposición
de Desechos y
Envases Vacíos.**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

Revisión : 4
Fecha : 07/01/2026
Aprobado : Área técnica