

Kapuchon[®] 760 WP

FUNGICIDA AGRÍCOLA

PQUA N° 3077 - SENASA

I. Información del Producto.

Nombre Comercial	: KAPUCHON 760 WP[®]
Clase de Uso	: Fungicida Agrícola
Ingrediente Activo	: Propineb 700 g/kg + Cymoxanil 60 g/kg
Concentración	: 760 g/kg
Formulación	: Polvo mojable (WP)
Grupo Químico	: Propineb: Ditiocarbamato; Cymoxanil: Acetoamide
Grupo FRAC	: Propineb: M 03; Cymoxanil: 27
Registro	: PQUA N° 3077 - SENASA
Categoría Toxicológica	: Ligeramente Peligroso

II. Datos de la Empresa.

Importador/Distribuidor	: Silvestre International Company S.A.C. (SICSAC)
Titular del Registro	: Silvestre International Company S.A.C. (SICSAC)

III. Modo y Mecanismo de Acción.

KAPUCHON 760 WP[®] es un fungicida que combina la acción del propineb con el cymoxanil, por lo cual se logra la inhibición de la respiración celular del patógeno, la inhibición de la síntesis de ADN, ARN y aminoácidos, así como la alteración del metabolismo celular fúngico lo que conlleva a su muerte.

Previene el desarrollo de las esporas y de los haustorios. Activa la respuesta del hospedero causando la decoloración de las células infectadas y colapso de las células adyacentes, logrando finalmente, que el patógeno quede aislado en la zona inicial de infección.

IV. Propiedades Físicoquímicas.

Estado físico	: Sólido (Polvo).
Color	: Blanco-Gris.
Olor	: Característico.
Densidad relativa a 20 °C	: 0.30 – 0.40 g/ml
pH	: 6.0 – 9.0

V. Características Físicoquímicas del Ingrediente Activo.**PROPINEB**

Peso Molecular	: 289.80 g/mol.
Solubilidad en Agua a 20 °C	: 10 mg/L
Coefficiente Kow	: - 0.26
Presión de Vapor a 20 °C	: 0.16 mPa

CYMOXANIL

Peso Molecular	: 198.18 g/mol.
Solubilidad en Agua a 20 °C	: 780 mg/L
Coefficiente Kow	: 0.67
Presión de Vapor a 20 °C	: 0.15 mPa

VI. Condiciones de Aplicación.

- En caso de la preparación de la mezcla, llenar el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad, en un rango de pH entre 5 – 7 para asegurar la estabilidad de los ingredientes activos del formulado, luego agregar el producto revolviendo constantemente y completar con agua hasta el volumen requerido.
- Aplicar el producto a primeras horas de la mañana o por la tarde, evitando las horas de máxima radiación, para facilitar la toma del producto en las hojas tratadas.
- Usar equipo de protección personal (EPP) durante el uso, mezcla y aplicación del producto.

VII. Compatibilidad del Producto.

KAPUCHON 760 WP[®] es compatible con otros plaguicidas de uso común excepto con aquellos de marcada reacción alcalina. En caso de duda, hacer pruebas previas de compatibilidad.

VIII. Fitotoxicidad.

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

IX. Frecuencia y Época de la aplicación.

Se recomienda utilizar **KAPUCHON 760 WP[®]** cuando se presenta condiciones favorables para el desarrollo del patógeno. Estas condiciones dependerán del historial de campo. Aplicar sólo una vez por campaña, considerando como máximo 2 campañas por año. En caso se requiera otra aplicación, rotar con otros productos de diferente modo de acción.

Revisión : 3
Fecha : 07/01/2026
Aprobado : Área técnica

X. Precauciones y Advertencia de Uso y Aplicación.

- Este producto es de cuidado. No ingerir.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas ni forraje.
- Usar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar este producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y bañarse con abundante agua y jabón.
- Conservar este producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto en lugares frescos, seco y con buena ventilación, lejos de casa - habitación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

XI. Cuadro de Usos Recomendado.

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	kg/200L	kg/ha		
Papa	Rancha o hielo fungoso	<i>Phytophthora infestans</i>	0.5	1.0	14	0.1

P.C.: Periodo de carencia

L.M.R.: Límite máximo de residuos

XII.**Teléfonos
de
Emergencia.****SAMU** : 106
SICSAC : (01) 644 9297 / (+51) 972 254 690**XIII.****Condiciones de
Manejo y de
Disposición
de Desechos y
Envases Vacíos.**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

Revisión : 3
Fecha : 07/01/2026
Aprobado : Área técnica