

Korbeto 400 EW

FUNGICIDA AGRÍCOLA

PQUA N° 3441 - SENASA

I. Información del Producto.

Nombre Comercial	: Korbeto 400 EW
Clase de Uso	: Fungicida Agrícola
Ingrediente Activo	: Prochloraz 267 g/L + Tebuconazole 133 g/L
Concentración	: 400 g/L
Formulación	: Emulsión, aceite en agua (EW)
Grupo Químico	: Imidazoles (Prochloraz) + Triazoles (Tebuconazole)
Grupo FRAC	: 3 (Prochloraz); 3 (Tebuconazole)
Registro	: PQUA N° 3441 - SENASA
Categoría Toxicológica	: Moderadamente Peligroso

II. Datos de la Empresa.

Importador/Distribuidor : Silvestre International
Company S.A.C. (SICSAC)

Titular del Registro : Silvestre International
Company S.A.C. (SICSAC)

III. Modo y Mecanismo de Acción.

KORBETO 400 EW es un fungicida de acción preventiva, curativa, sistémico y de contacto.

KORBETO 400 EW combina el efecto de dos ingredientes activos proporcionando una acción prolongada y antiesporulante contra hongos asegurando la protección de las hojas.

KORBETO 400 EW contiene Prochloraz que presenta un marcado efecto translaminar (sistemía local) que protege a la superficie y la capa superior de las hojas, asegurando el cicatrizado sobre las infecciones tratadas.

KORBETO 400 EW por efecto del Tebuconazole tiene acción sistémica e inhibe la síntesis de ergosterol de los hongos, y al trasladarse de forma acropétala (hacia arriba) en las plantas protege a los nuevos brotes, además esta característica le confiere un gran efecto curativo en etapas avanzadas de la enfermedad.

IV. Propiedades Físicoquímicas.

Estado físico	: Líquido.
Color	: Blanco.
Olor	: Característico.
Densidad relativa a 20 °C	: 1.27 - 1.42 g/ml
pH	: 5.0 - 8.0

V. Características Físicoquímicas del Ingrediente Activo.**- PROCHLORAZ:**

Peso Molecular	: 376.7 g/mol.
Solubilidad en Agua a 20 °C	: 26.5 mg/L
Coefficiente Kow	: 3.50
Presión de Vapor a 20 °C	: 0.15 mPa

- TEBUCONAZOLE:

Peso Molecular	: 307.82 g/mol.
Solubilidad en Agua a 20 °C	: 36 mg/L
Coefficiente Kow	: 3.70
Presión de Vapor a 20 °C	: 0.0013 mPa

VI. Condiciones de Aplicación.

- En caso de la preparación de la mezcla, llenar el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad, en un rango de PH entre 5 - 7 para asegurar la estabilidad de los ingredientes activos del formulado, luego agregar el producto revolviendo constantemente y completar con agua hasta el volumen requerido.
- Aplicar el producto a primeras horas de la mañana o por la tarde, evitando las horas de máxima radiación, para facilitar la toma del producto en las hojas tratadas.
- Usar equipo de protección personal (EPP) durante el uso, mezcla y aplicación del producto.

VII. Compatibilidad del Producto.

Es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso agrícola, excepto con los de reacción alcalina. Se recomienda realizar una prueba de compatibilidad.

VIII. Fitotoxicidad.

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

IX. Frecuencia y Época de la aplicación.

Realizar máximo una aplicación por campaña. Se debe de aplicar en forma preventiva, o tan pronto se observen los primeros síntomas de la enfermedad, o cuando las condiciones sean las apropiadas para el desarrollo de la enfermedad. Rotar con fungicidas de diferentes modos de acción siguiendo los lineamientos de FRAC (Comité de acción contra la resistencia de Fungicidas) dentro de un programa de manejo integrado de enfermedades.

Revisión : 3
Fecha : 07/01/2026
Aprobado : Área técnica

X. Precauciones y Advertencia de Uso y Aplicación.

- Este producto es tóxico si se ingiere.
- Peligroso si es inhalado, evite respirar aspersión.
- Este producto causa irritación moderada a los ojos.
- Cuidado, evite el contacto. Posible teratogénico.
- No coma, no beba ni fume durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Consevar el producto en el envase original etiquetado, cerrado y en un lugar fresco.
- Utilice ropa protectora y guantes durante la preparación de la mezcla y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No reutilizar ni almacenar alimentos y bebidas en el envase vacío.

XI. Cuadro de Usos Recomendado.

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/200L	L/ha		
Arroz	Pyricularia	<i>Pyricularia oryzae</i>	-	0.5	35	a) 1.0 b) 1.5

P.C.: Periodo de carencia

 L.M.R.: Límite máximo de residuos
 a) Prochloraz; b) Tebuconazole
XII.

Teléfonos de Emergencia.

 SAMU : 106
 SICSAC : (01) 644-9297
XIII.

Condiciones de Manejo y de Disposición de Desechos y Envases Vacíos.

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.


 Revisión : 3
 Fecha : 07/01/2026
 Aprobado : Área técnica