

SIL-ODIN®

750 WG

FUNGICIDA AGRÍCOLA

PQUA N° 2803 - SENASA

I. Información del Producto.

Nombre Comercial	: SIL-ODIN® 750 WG
Clase de Uso	: Fungicida Agrícola
Ingrediente Activo	: Tebuconazole 500 g/kg + Azoxystrobin 250 g/kg
Concentración	: 750 g/kg
Formulación	: Gránulos dispersables (WG)
Grupo Químico	: Triazol (Tebuconazole) + Estrobilurina Methoxy-acrylates (Azoxystrobin)
Grupo FRAC	: 3 (Tebuconazole) 11 (Azoxystrobin)
Registro	: PQUA N° 2803 - SENASA
Categoría Toxicológica	: Ligeramente Peligroso

II. Datos de la Empresa.

Importador/Distribuidor	: Silvestre International Company S.A.C. (SICSAC)
Titular del Registro	: Silvestre International Company S.A.C. (SICSAC)

III. Modo y Mecanismo de Acción.

SIL-ODIN® 750 WG actúa como un fungicida sistémico con un elevado poder preventivo al inicio de las infecciones y curativo anti esporulante en infecciones más avanzadas. **SIL-ODIN® 750 WG** posee dos ingredientes activos que son transportados de manera apical y translaminar en las hojas tratadas para asegurar una máxima cobertura del producto.

SIL-ODIN® 750 WG por efecto del Tebuconazole actúa inhibiendo la biosíntesis del ergosterol, durante la penetración y formación de haustorios, paralizando el desarrollo del hongo al interferir la biosíntesis de las membranas celulares y alterando su permeabilidad, esta característica le confiere un gran efecto curativo en etapas avanzadas de la enfermedad.

SIL-ODIN® 750 WG es un fungicida que por efecto del Azoxystrobin actúa como inhibidor de la respiración mitocondrial, interrumpiendo el flujo de energía durante el proceso infectivo desarrollado por las conidias del hongo.

IV. Propiedades Físicoquímicas.

Estado físico	: Gránulos.
Color	: Marrón claro.
Olor	: Ligero.
Densidad relativa a 20 °C	: 0.50 - 0.60 g/cm³
pH	: 6.0 - 9.0

V. Características Físicoquímicas del Ingrediente Activo.**TEBUCONAZOLE:**

Peso Molecular	: 307.82 g/mol.
Solubilidad en Agua a 20 °C	: 36 mg/L
Coefficiente Kow	: 3.70
Presión de Vapor a 20 °C	: 0.0013 mPa

AZOXYSTROBIN:

Peso Molecular	: 403.4 g/mol.
Solubilidad en Agua a 20 °C	: 6.7 mg/L
Coefficiente Kow	: 2.50
Presión de Vapor a 20 °C	: 1.10 x 10 ⁻⁰⁷ mPa

VI. Condiciones de Aplicación.

- En caso de la preparación de la mezcla, llenar el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad, en un rango de PH entre 5 – 7 para asegurar la estabilidad de los ingredientes activos del formulado, luego agregar el producto revolviendo constantemente y completar con agua hasta el volumen requerido.
- Aplicar el producto a primeras horas de la mañana o por la tarde, evitando las horas de máxima radiación, para facilitar la toma del producto en las hojas tratadas.
- Usar equipo de protección personal (EPP) durante el uso, mezcla y aplicación del producto.

VII. Compatibilidad del Producto.

Es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto agentes de oxidantes. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

VIII. Fitotoxicidad.

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

IX. Frecuencia y Época de la aplicación.

Para el cultivo de espárrago se recomienda una aplicación por campaña (2 campañas/año). Para el cultivo de alcachofa se recomienda 2 aplicaciones por campaña (1 campaña/año), aplicar en inducción floral y en etapa de cosecha, con gasto de agua de 400 L/ha. Considerar un programa de rotación siguiendo los lineamientos de FRAC (Comité de acción contra la resistencia de Fungicidas), con fungicidas de diferentes modos de acción.

Revisión : 7
Fecha : 09/01/2026
Aprobado : Área técnica

X. Precauciones y Advertencia de Uso y Aplicación.

- Peligroso si es inhalado, evite respirar el vapor o la aspersión.
- El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel e inhalación
- No coma, no beba ni fume durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora y guantes durante la preparación de la mezcla y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No reutilizar ni almacenar alimentos y bebidas en el envase vacío.

XI. Cuadro de Usos Recomendado.

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	kg/200L	kg/ha		
Alcachofa	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	0.15	-	21	0.6 (a) 5.0 (b)
Arroz	Pyricularia	<i>Pyricularia oryzae</i>	0.15-0.2	-	21	1.5 (a) 5 (b)
Café	Roya Amarilla	<i>Hemileia vastatrix</i>	0.2	-	30	0.15 (a) 0.03 (b)
Cebolla	Mancha del peral	<i>Stemphylium vesicarium</i>	0.1 - 0.15	-	14	0.1(a) 1.0 (b)
Espárrago	Mancha del peral	<i>Stemphylium vesicarium</i>	-	0.4 - 0.8	40	0.05 (a) 0.04 (b)
Maíz	Mancha negra	<i>Phyllachora maydis</i>	0.1	-	21	0.6 (a) 0.02 (b)
Vid	Oidium	<i>Erysiphe necator</i>	-	0.25	14	0.5 (a) 3.0 (b)

P.C.: Periodo de carencia

L.M.R.: Límite máximo de residuos

(a) Tebuconazole
(b) Azoxystrobin

XII.

**Teléfonos
de
Emergencia.**

SAMU : 106
SICSAC : (01) 644-9297

XIII.

**Condiciones de
Manejo y de
Disposición
de Desechos y
Envases Vacíos.**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

Revisión : 7
Fecha : 07/01/2026
Aprobado : Área técnica