

TAZU[®] 250 EW

FUNGICIDA AGRÍCOLA

PQUA N° 2814 - SENASA

I. Información del Producto.

Nombre Comercial	: TAZU [®] 250 EW
Clase de Uso	: Fungicida Agrícola
Ingrediente Activo	: Difenconazole
Concentración	: 250 g/L
Formulación	: Emulsión, aceite en agua (EW)
Grupo Químico	: Triazoles
Grupo FRAC	: 3
Registro	: PQUA N° 2814 - SENASA
Categoría Toxicológica	: Ligeramente Peligroso

II. Datos de la Empresa.

Importador/Distribuidor : Silvestre International Company S.A.C. (SICSAC)

Titular del Registro : Silvestre International Company S.A.C. (SICSAC)

III. Modo y Mecanismo de Acción.

TAZU[®] 250 EW es un fungicida que tiene propiedades sistémicas locales y una gran acción translaminar, asegurando así su función protectora y curativa contra hongos foliares. **TAZU[®] 250 EW** actúa inhibiendo la biosíntesis del ergosterol, es decir, la dimetilación de los esteroides, los cuales son esenciales para la síntesis normal de las membranas celulares del hongo. **TAZU[®] 250 EW** por su gran acción subcuticular y su elevada actividad biológica puede ser usado por el control de un gran número de enfermedades foliares.

IV. Propiedades Físicoquímicas.

Estado físico	: Líquido.
Color	: Blanco lechoso.
Olor	: Ligero.
Densidad relativa a 20 °C	: 0.95 - 1.06 g/ml
pH	: 6.0 - 8.0

V. Características Físicoquímicas del Ingrediente Activo.

Peso Molecular	: 406.26 g/mol.
Solubilidad en Agua a 20 °C	: 15.0 mg/L
Coefficiente Kow	: 4.36
Presión de Vapor a 20 °C	: 3.33 X 10 ⁻⁰⁵ mPa

VI. Condiciones de Aplicación.

- Aplicar el producto a primeras horas de la mañana o por la tarde, evitando las horas de máxima radiación.
- En caso de la preparación de la mezcla, llenar el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad, en un rango de PH entre 6 - 7 para asegurar la estabilidad del ingrediente activo, luego agregar el producto revolviendo constantemente y completar con agua hasta el volumen requerido.
- Si los cultivos tratados tienen hojas muy cerosas, complementar los tratamientos con el uso de adherentes y/o surfactantes para asegurar el mayor depósito de producto sobre la hoja tratada.
- Usar equipo de protección personal (EPP) durante el uso, mezcla y aplicación del producto.

VII. Compatibilidad del Producto.

TAZU[®] 250 EW es incompatible con ácidos, bases y materiales oxidantes. No se ha reportado algún tipo de incompatibilidad con pesticidas. Al realizar la mezcla, es recomendable efectuar una confirmación previa de compatibilidad.

VIII. Fitotoxicidad.

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

IX. Frecuencia y Época de la aplicación.

Aplicar al observar los primeros síntomas o de manera preventiva cuando las condiciones climáticas predisponen el inicio de la enfermedad, en caso de realizar varias aplicaciones por campañas rotar con otros fungicidas siguiendo los lineamientos de FRAC (Comité de acción contra la resistencia de Fungicidas), dentro de un manejo integrado de enfermedades.

Revisión : 7
Fecha : 07/01/2026
Aprobado : Área técnica

X. Precauciones y Advertencia de Uso y Aplicación.

- Este producto es de cuidado. No ingerir.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas ni forraje.
- Usar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar este producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y bañarse con abundante agua y jabón.
- Conservar este producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto en lugares frescos, seco y con buena ventilación, lejos de casa - habitación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

XI. Cuadro de Usos Recomendado.

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	mL/200L	L/ha		
Alcachofa	Oídium	<i>Leveillula taurica</i>	150 - 200	-	3	1.5
Arándano	Blueberry Leaf Rust	<i>Thekopsora minima</i>	100 - 200	-	21	4
Arroz	Pyricularia	<i>Pyricularia orizae</i>	150 - 200	-	35	8
Cebolla	Mancha del peral	<i>Sthemphylium vesicarium</i>	*150 - 200	-	21	0.1
Espárrago	Mancha del peral	<i>Sthemphylium vesicarium</i>	150 - 200	-	7	0.03
Mandarina	Cladosporium	<i>Cladosporium herbarum</i>	100 - 200	-	30	0.6
Palto	Cladosporium	<i>Cladosporium herbarum</i>	200	-	14	0.6
Papa	Tizón temprano	<i>Alternaria solani</i>	150 - 200	-	1	4
Pimiento	Oídium	<i>Leveillula taurica</i>	150 - 250	-	14	0.6
Vid	Oidiosis	<i>Erysiphe necator</i>	150 - 200	-	7	3
Zapallo	Oidiosis	<i>Erysiphe cichoracearum</i>	200	0.42	7	0.01

P.C.: Periodo de carencia

*Para un volumen de agua de 400 L/ha

L.M.R.: Límite máximo de residuos

XII.Teléfonos
de
Emergencia.

SAMU : 106
SICSAC : (01) 644-9297

XIII.Condiciones de
Manejo y de
Disposición
de Desechos y
Envases Vacíos.

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



Revisión : 7
 Fecha : 07/01/2026
 Aprobado : Área técnica